

il maiale da carne

giancarlo geri



edagricole




Fig. 37. - Scrofe di razza Cinta senese al pascolo su medicaio.
(Foto Uzielli, Paganico)

dose massima di 8 kg per i maiali di cui si vuole frenare, nell'ultimo periodo che precede la mattazione, l'accrescimento.

Topinambur. - È un tubero molto simile alle patate e, come queste, va somministrato cotto. Può essere sostituito a queste nei terreni poveri.

2) MANGIMI CONCENTRATI.

a) *Semi di cereali.* - Costituiscono ovunque la base dell'alimentazione dei maiali delle diverse età. Sono molto appetiti, facilmente digeribili ed hanno un elevato potere nutritivo. Il loro contenuto in proteine (che d'altronde non sono di valore biologico molto elevato) è piuttosto scarso. Il difetto maggiore è la loro estrema povertà di calcio.

Mais. - È, nel nostro ed in altri paesi, il cereale più usato nell'alimentazione dei maiali. Le varietà gialle sono relativamente ricche della provitamina A, mentre le bianche ne sono prive. La proteina del mais presenta gravi deficienze qualitative, talché questo alimento deve essere sempre somministrato con complementi proteici di elevato valore biologico, come farina di carne o di pesce, lievito di birra, latte scremato, ecc. Un altro appunto che deve